

ความผิดทางกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งเสพติด

สิ่งเสพติดที่ทำให้เกิดความผิดทางกฎหมายไทย มี 5 ประเภท คือ

ประเภทขอสารเสพติด

โทษทางกฎหมาย

ประเภทที่ 1

ได้แก่ เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า
, ยาไอซ์) เฮโรอีน แอมเฟตามีน

ผู้ที่กระทำความผิดโดยการครอบครอง
เพื่อเสพหรือเสพสารเสพติดให้โทษประเภท
ที่ 1 มีโทษทางกฎหมาย คือ โทษจำคุก
อย่างสูง 10 ปี และปรับสูงสุด 200,000
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และในกรณีที่มีการ
ครอบครองสารเสพติดให้โทษในประเภทนี้
เกินกว่า 20 กรัม กฎหมายให้ถือว่าเป็นการ
ครอบครองไว้เพื่อจำหน่าย ซึ่งโทษขั้นสูงสุด
คือ ประหารชีวิต

ประเภทขอสารเสพติด	โทษทางกฎหมาย
<p data-bbox="19 128 309 214">ประเภทที่ 2</p> <p data-bbox="19 242 927 556">ได้แก่ มอร์ฟีน,โคเคน, แคลตามีน, โคดีน ผีน, สารสกัดจากฝิ่น, เมธาโดน</p>	<p data-bbox="994 128 1912 971">การครอบครองสารเสพติดในประเภทที่ 2 นี้ อาจทำได้โดยถูกกฎหมาย หากเป็นการครอบครอง เพื่อวัตถุประสงค์และในจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้ แต่ถ้าเป็นการครอบครองที่ขัดต่อข้อกำหนดของกฎหมายแล้วนั้นย่อมเป็นความผิด และมีโทษ คือ โทษจำคุกชั้นสูง 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
<p data-bbox="19 1013 309 1099">ประเภทที่ 3</p> <p data-bbox="19 1128 946 1413">วัตถุที่ทำให้เกิดความมึนเมา สารที่สกัดได้จากฝิ่น และสารที่มีส่วนประกอบของสารเสพติดในประเภทที่ 2</p>	<p data-bbox="994 1013 1912 1413">การครอบครองสารเสพติดในประเภทที่ 3 ที่ใช้ในทางการแพทย์ อาจมีไว้ในครอบครองได้ ตามกฎหมาย ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายเช่นกัน</p>

ประเภทของสารเสพติด

โทษทางกฎหมาย

ประเภทที่ 4

สารที่ประกอบเป็นสารเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2

ผู้ที่มีไว้ในครอบครอง มีความผิด โทษจำคุก 5 ปี และปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ


ประเภทที่ 5

วัตถุที่ทำให้เกิดความมึนเมา สารเสพติดอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ใน 4 ประเภทก่อน ประกอบด้วย กัญชา และเห็ดเมา

ผู้ครอบครองหรือเสพสารเสพติดในประเภทนี้มีความผิดและมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา

เป้าหมายในการใช้ยา



- รักษา
- บรรเทาอาการ
- ป้องกัน

ผลข้างเคียงของยา



- คลื่นไส้ อาเจียน กระสับกระส่าย
- นอนไม่หลับ ง่วงตลอดเวลา
- อาการผื่นลมพิษ มีผื่นแดงและลอก
ไหม้บริเวณ เยื่อต่างๆ
- แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก ช็อก
หมดสติ
- ระบบอวัยวะในร่างกายถูกทำลาย(ตับ)

แนวปฏิบัติในการใช้ยาที่ถูกต้อง

- **ถูกโรค** ใช้ยาให้ถูกกับโรคที่เป็น เนื่องจากสาเหตุการเกิดโรคต่างกัน
- **ถูกขนาด** ขนาดยา คือจำนวนยาที่ให้เข้าไปในร่างกายเพื่อเกิดผลในการรักษาที่ดีที่สุด
- **ถูกเวลา** กำหนดช่วงเวลาและระยะเวลาที่ให้ เพราะการที่ยาจะออกฤทธิ์ในร่างกายได้ดีจะต้องระดับยาในร่างกายที่เหมาะสมจึงควรให้ยาตรงเวลา
- **ถูกบุคคล** เหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วยแต่ละคน เช่น วัยเด็ก ผู้ใหญ่ หญิงตั้งครรภ์
- **ถูกทางและวิธี** ยาในปัจจุบันมีวิธีการใช้หลายรูปแบบ เช่น ยาเม็ด ยาน้ำ ยาทา ยาหยอด บางชนิดอมไว้ใต้ลิ้น บางชนิดห้ามเคี้ยว ยาเหน็บ ยาทาภายนอก ห้ามรับประทาน ยาพ่น เป็นต้น

อาการอันไม่พึงประสงค์

1. การรับยาติดต่อกันเป็นเวลานาน

2. การดื้อยา

3. การติดยา

4. อันตรายจากพิษของยา

5. การเสื่อมและการหมดอายุของยา

กลุ่มยาอายุสั้นหรือเสื่อมสภาพง่าย

Exp. 20.11.15 หมายความว่า ยาหมดอายุวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

Used before 10.15 หมายความว่า ยาหมดอายุเดือนตุลาคม 2558

กลุ่มยาที่มีอายุยาว หรือเสื่อมสภาพช้า ไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 5 ปี
นับจากวันที่ผลิต

Mfg. Date 14.05.11 หมายความว่า ยาผลิตเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2554
ซึ่งไม่ควรเก็บไว้เกินวันที่ 14 เมษายน 2559